

Sitetroveで 理想の治験責任医師を選ぶ

お客様に代わってSitetrove（サイトトローブ）が
治験の被験者候補を持つ、実績のある治験責任医師をお選びします

治験の概要

疾患：非小細胞肺癌

治療：アジュバント療法を使用したレジメン

実施国：米国


非小細胞肺癌（NSCLC）に対しアジュバント（術後補助） 療法を使用した治験の経験がある治験責任医師を特定



最適な治験責任医師、すなわちお客様が計画されている治験と類似の治験の経験が豊富な治験責任医師選びは最重要課題といえます。Sitetroveには、アジュバント療法を使用したNSCLC試験の経験がある米国の治験責任医師が1,993人収録されています。

治験責任医師優先順位付けツールを使えば、階層1の治験責任医師を素早く特定できます。階層1の治験責任医師は、階層2や3と比べて特定の疾患に対する治験の成功可能性が最も高い医師群です。該当者は計405人です。

治験責任医師特定プロセスに患者の規模をプラス



検索条件を加え、過去24ヵ月間の診療報酬請求データをもとに治験責任医師の被験者候補の条件を決定、Sitetrove内で集めることもできます。

患者セグメントであるアジュバントを条件から外し、階層1の治験責任医師で過去2年間にNSCLC患者を診察したことのある医師を検索。その結果、お客様の治験に適格な治験責任医師候補が抽出されます。


階層1で過去2年間に100人以上のNSCLC患者を診察した治験責任医師は458人です。

出典：Sitetrove（2020年10月）

理想の治験責任医師群を特定

それぞれの結果を比較して重複する治験責任医師を特定、これを最適な被験者群を持つ、最適な実績を有する治験責任医師群とします。

すなわちアジュバント療法を使用した治験の実績があり、過去2年間に100人以上のNSCLC患者を診察した階層1の米国の治験責任医師は285人です。



出典：Sitetrove（2020年10月）

Sitetroveは、180カ国50万人以上の治験責任医師と、235以上の疾患に対応する11万7,500カ所以上の治験施設情報を収録。幅広く高度な検索条件で絞り込めるため、最適な医師と施設を迅速に特定できます。

ご不明点などございましたら、inquiry.jp@informa.comまでお気軽にお問い合わせ下さい。